

aus der Medizinischen Klinik der Universität Erlangen.
Direktor: Professor Dr. L. R. Müller.

Der hypoglykämische Schock und die von ihm hervorgerufenen Veränderungen am Zentralnervensystem.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde
einer Hohen Medizinischen Fakultät der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen

vorgelegt von

Adolf Wolff

Approbierter Arzt
aus Schopflohe.

Tag der mündlichen Prüfung: 18. 5. 1935.

Uradt (Württbg.)

Druck der Fr. Böhlerschen Buchdruckerei / Inh. Dr. Otto Weise
1935

Referent: Priv.Doiz. Dr. Bodehtel.

Dekan: Geh. Rat Prof. Dr. Jamin.

Meinem Onkel, Oberstudienrat Christoph Wolff
in tiefer Dankbarkeit und Verehrung gewidmet.

Literatur-Verzeichnis.

- Schleussing, Deutsches Archiv f. klin. Medizin, 176. Bd.
Heft 1.
- Bodechtel, Deutsches Archiv f. klin. Medizin, 175. Bd.
Heft 2.
- Stief und Tokay, Zentralblatt f. d. gesamte Neurologie und
Psychiatrie, 139. Bd., 3. u. 4. Heft.
- Wohlwill, Klinische Wochenschrift 1928, Nr. 8, S. 344 ff.
- Spielmeyer, Zentralblatt f. d. gesamte Neurologie und
Psychiatrie, Bd. 44, S. 467 ff.
- Thannhauser, Klinische Wochenschrift 1933, S. 1054 ff.
- Ehrmann und Jakobi, Klinische Wochenschrift 1925, S. 2151 ff.,
Deutsche Med. Wochenschrift 1924, S. 130 ff.
- Rheinwein, Deutsche Med. Wochenschrift 1931, Heft 1,
S. 571 ff.
- Irsigler, Archiv f. klin. Chirurgie 1933, Bd. 177.
- Scholz, Z. neur. 145, S. 471.
- Scherer, Z. neur. 134, S. 60.
-

Einleitung.

Seitdem wir das Insulin kennen sind uns auch seine Nachteile bekannt, nämlich die durch seine Ueberdosierung hervorgerufenen Schädigungen, sei es bei planmässiger Insulinvergiftung im Tierexperiment, oder sei es in Gestalt des bekannten und wegen seines oft so uncharakteristischen Auftretens gefürchteten hypoglykämischen Schocks bei Diabetikern. Es wurden für sein Zustandekommen von den verschiedenen Autoren mancherlei interessante Theorien aufgestellt, die aber alle noch nicht hinreichend bewiesen werden konnten und deren Wichtigste hier kurz angeführt seien:

Einmal soll das verminderte Traubenzuckerangebot an die Zellen zum hypoglykämischen Schock führen, zum anderen die ihn meist begleitende Aenderung im Säure-Basen-Gleichgewicht; oder es soll durch die Wasseranreicherung zu einem Hirnödem kommen, wodurch die cerebralen Erscheinungen ausgelöst werden.

Weiterhin wird dem plötzlichen Abwandern der Phosphate ins Blut eine toxische Wirkung beigemessen. Wohlwill macht die Alkalose verantwortlich, japanische Autoren den Abfall des onkotischen Drucks im Blutplasma. Alle diese Auffassungen treffen nicht den Kern des Problems. Wohl findet man Anhaltspunkte für ein Hirnödem, auch die Störung des Säure-Basen-Gleichgewichtes ist zweifellos im hypoglykämischen Schock vorhanden, aber hier handelt es sich nur um Begleitsymptome, die nicht den eigentlichen pathogenetischen Faktor darstellen. Dasselbe gilt für die Beobachtungen von Ehrmann und Jakobi, die wohl als erste auf die Auswirkung des hypoglykämischen Schocks auf die Zirkulation hinwiesen.

Wenn man die eigentliche Ursache des hypoglykämischen Schocks beleuchtet, so darf man sich nicht nur mit den ihn begleitenden Symptomen beschäftigen, die wohl für den Ausgang ausschlaggebend sein können, sondern man muss die seinem Wesen zugrunde liegenden schweren Störungen vor allem im Leberstoffwechsel unterstreichen, für welche in erster Linie die Tierexperimente Anhaltspunkte gegeben haben. So sieht Beck in der Leberglykogen-Blockade die primäre Ursache, was eine gewisse Unterstützung erfährt durch die Untersuchungen Fischlers, der bei entlebten Tieren Erscheinungen auslösen konnte, die dem hypoglykämischen Schock durchaus ähnlich waren und sich auch durch grosse Traubenzucker-Injektionen vorübergehend beheben liessen. Ueber den Angriffspunkt, ob Leberzelle oder Kupfersche Sternzelle sind wir durch die Untersuchungen Irsiglers unterrichtet worden, der zeigen konnte, dass bei Blockade des Stern-

zellen-Systems die hypoglykämische Reaktion in viel grösseren Umfange einsetzt.

Für die folgenden Ausführungen ist die Frage nach der primären Ursache des Schocks weniger von Bedeutung, denn sie beschäftigen sich mit den Veränderungen am Gehirn, die mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch Kreislaufstörungen hervorgerufen werden. Diese sind aber ebenso als Begleitsymptome aufzufassen wie die obengenannten Störungen im Säure-Basen-Gleichgewicht oder der Abfall des onkotischen Drucks oder die Abwanderung der Phosphate ins Blut. Dass Kreislaufstörungen einen Teil des klinischen Bildes des hypoglykämischen Schocks darstellen, ist schon länger bekannt. Es sei nur an die immer wieder betonten Störungen am Herzgefässapparat erinnert an die Brady- und Tachycardie, Änderung des Schlagvolumens, Kapillar-Erweiterungen und pathognomonische Senkung des Blutdrucks, deren Feststellung uns ja auch gelegentlich bei der Diagnose unterstützt. Aber nicht nur diese klinischen Beobachtungen sondern auch pathologisch-anatomische Tatsachen, die man bei den allerdings seltenen „Insulin-Todesfällen“ beobachten konnte, weisen in diese Richtung. So haben *Ehrmann* und *Jakob* über Blutungen in der Pleura-, Magen- und Darmschleimhaut berichtet, auch in der Pia und der Hirnsubstanz konnten sie solche feststellen. Noch eindeutiger sind in dieser Beziehung die tierexperimentellen Studien von *Stief* und *Tokay*, die bei subakuten Insulinvergiftungen an Hunden und Kaninchen herdförmige Ausfälle in der Hirnrinde ihrer Versuchstiere nachweisen konnten, die nach der Meinung *Bodechtels* vollkommen übereinstimmen mit den Rindenschädigungen, wie sie *Bodechtel* und *Müller* bei experimentellen Hirnembolien, also bei ausgesprochenen Zirkulationsstörungen, erzeugen konnten. Allerdings haben *Stief* und *Tokay* nicht diese letzte Konsequenz gezogen, sondern auch anderen Momenten, insbesondere toxischen Einwirkungen des Insulins beim Zustandekommen dieser Hirnschäden eine wesentliche Rolle eingeräumt. Sie wurden nicht zuletzt durch frühere Untersuchungen *Wohlwills*, auf welche wir später noch zurückkommen, zu diesem Schluss veranlasst; denn *Wohlwill* ist der Ansicht, dass das schädliche Agens für die Nervenzellen „eine Veränderung des chemisch-physikalischen Milieus bildet. Er macht in erster Linie die beim hypoglykämischen Schock gelegentlich nachgewiesene Alkalose verantwortlich, die zu einer toxischen Schädigung nicht nur der Hirnrinde, sondern auch des Hirnmarks führt.

Im Gegensatz zu *Wohlwill* sieht *Bodechtel* den wesentlichen Faktor beim Zustandekommen der cerebralen Erscheinungen und der möglichen Dauerschäden in einer funktionellen

Gefäßstörung in Form von Spasmen oder Stasen im Kapillarkreislauf der Hirnrinde, für welche nicht nur die geschilderten makroskopischen Befunde von Blutungen (Ehrmann und Jakob) oder die klinischen Erscheinungen am Zirkulationsapparat (Hypotonie, Tachy- und Bradycardie, Verminderung des Schlagvolumens), sondern auch die tierexperimentellen Ergebnisse Stief und Tokays sprechen. Kurz nach dem Erscheinen der Arbeit Bodechtels wurde ein halbes Jahr später in der gleichen Zeitschrift von Schleussing und Schuhmacher über eine Grosshirnschädigung im Verlauf eines Diabetes mellitus berichtet, deren mikroskopische Bilder gleichfalls auf Zirkulationsstörungen hindeuteten. Die in dieser Arbeit wiedergegebene Krankengeschichte lässt aber unschwer erkennen, dass nicht etwa ein Coma diabeticum sondern ein hypoglykämischer Schock vorlag, was später noch näher begründet werden soll.

Vor kurzer Zeit erschienen nun Mitteilungen von Ostertag, Dünner und Tannhauser, die in Fortsetzung der Untersuchungen von Stief und Tokay dem Problem der experimentellen Insulin-Vergiftung nachgingen. Obgleich diese Autoren schwere Veränderungen am Zirkulationsapparat feststellten, betonen sie doch die degenerativen Veränderungen am Nervenparenchym, zwar sowohl an der Rinde wie im Mark und die Hirnswellung. Allerdings glauben sie den Beweis für eine primäre Gefässerkrankung erbringen zu können.

Obwohl die Tierexperimente Stief und Tokays, auch diejenigen von Ostertag, Dünner und Tannhauser die Pathogenese der Hirnschäden beim hypoglykämischen Schock geklärt erscheinen lassen, liegen für die menschliche Pathologie, abgesehen von den Mitteilungen Wohlwills, Bodechtels, Schleussings und Schumachers doch noch zu wenig Berichte über das Wesen der beim hypoglykämischen Schock stattfindenden Hirnveränderungen vor. Allerdings hat es den Anschein, als wären sich die Autoren über die Deutung der jeweils erhobenen Befunde noch nicht einig. Sie klammern sich m. E. zu sehr an das jeweilige histologische Zustandsbild und vergessen das zeitliche Moment richtig einzuschätzen. Darf doch nicht vergessen werden, dass die histologischen Befunde von Fall zu Fall wechseln können, je nachdem Zeit verstrichen ist vom Eintreten des hypoglykämischen Schocks bis zum Exitus des Patienten. Jeder greifbare Schaden des Z.N.S. braucht aber Zeit zur Entwicklung und so können die Veränderungen an den verschiedenen Gewebelementen insbesondere auch an den Gefässen und auch die Verhältnisse hinsichtlich der Abräumung innerhalb der Herde einem grossen Wechsel unterliegen. Wenn z. B. Ostertag, Dünner und Tannhauser das Primäre auf die Gefässverände-

rungen im Sinne von Endothelproliferationen legen und das histologische Bild der Insulinspätchädigung charakterisieren wollen, so vergessen sie, dass solche Endothelproliferationen in zirkulatorisch geschädigten Gebieten immer erst relativ spät in Erscheinung treten, denn sie brauchen viel längere Zeit zu ihrer Entwicklung als die Ganglienzell-Veränderungen oder das Absterben der Nervenzellen, welches die sogenannten Erblebungen, d. s. ischaemische Bezirke, bedingt. Infolgedessen können die Gefässveränderungen auch nicht das Primäre sein! Die Berücksichtigung des zeitlichen Faktors ist aber für die Deutung des zeitlichen histologischen Zustandsbildes am ausschlaggebendsten. Darüber muss man sich im klaren sein, wenn man Vergleiche zwischen Befunden der einzelnen Autoren anstrebt, um damit das Wesen der hypoglykämischen Hirnschädigung zu beleuchten. Wenn man in den Befunden das Aussehen der Rindenschädigungen sowohl in den Fällen von Wohlwill, wie in dem von Bodechtel und in dem von Schleussing und Schuhmacher vergleicht, so hat dies in erster Linie seinen Grund darin, dass bei diesen Fällen vom Auftreten des hypoglykämischen Schocks an bis zum Exitus gerechnet, Stunden (Wohlwill) bis zu mehreren Tagen (Schleussing und Schuhmacher) verstrichen waren. Bei der Seltenheit der sogenannten Insulintodesfälle scheint es deshalb wichtig, auch jeden einzelnen Fall gründlich zu studieren, damit man sich an Hand der verschiedensten klinischen Details ein Bild machen kann vom Wesen der beim hypoglykämischen Schock auftretenden Hirnschäden. Aus diesem Grunde erscheint uns auch die Mitteilung des folgenden Falles wichtig.

Durch das liebenswürdige Entgegenkommen des Oberarztes Dr. Hallervorden der Heilanstalt Landsberg a. W. kam die medizinische Klinik Erlangen in seinen Besitz.

Es handelte sich dabei um einen 29jährigen jungen Mann, der zur Aufnahme in die Anstalt kam, nachdem er vorher 2 Tage lang Krämpfe hatte. Er sei zuckerleidend gewesen und hätte sich immer 2×30 Einheiten Insulin gespritzt, bei 100 gr Weissbrots täglich. Ueber die Urinbefunde vor den Krämpfen wird nichts berichtet. Die Krämpfe seien wieder vorbeigegangen und danach sei er geistesgestört, desorientiert und gewalttätig gewesen. Bei der Aufnahme des Patienten in die Anstalt dachte man zuerst an eine Epilepsie. Im Urin war 1% Zucker. Der körperliche Befund war ohne Besonderheiten. Die Temperatur betrug 36,2 Grad. Am nächsten Tag Entwicklung einer tobsüchtigen Erregung mit Neigung zu Gewalttätigkeiten. Die Insulindosierung mit 2×30 Einheiten wird beibehalten. Der Blutzucker betrug 220 mgr. %. In der Folgezeit zeigt Patient eine dauernde Unruhe, wird gewalttätig und muss ständig unter Schlafmitteln gehalten werden. Ein

ausführliche Blutzuckerkurve liegt nicht vor. Einen Monat nach Aufnahme tritt ein komatöser Zustand ein. Im Urin sind 7,6 % Zucker, Aceton positiv, Acet-Essigsäure 2fach positiv, bei starkem Acetongeruch in der Ausatemungsluft. Nach 2 Tagen ist der Zustand wieder soweit gebessert, aber Patient ist ängstlich und unruhig, äussert Wahnideen und ist uneinsichtig. Der Urinzucker schwankt zwischen 3 und 5 %. 4 Wochen nach der Aufnahme, bei täglicher Verabreichung von 2 mal 20 Einh. Insulin starke Schwankungen des Urinzuckergehaltes zwischen 0 und 3 %. 8 Wochen nach der Aufnahme tritt ein starker Anfall mit Aufschreien, Verziehen des Gesichtes, mit Zuckungen in Armen und Beinen und ruckartigen Bewegungen des Kopfes nach der Seite auf. Das Gesicht ist blau verfärbt, Acetongeruch ist nicht nachweisbar. Patient bekommt wieder 50 Einheiten Insulin. Am nächsten Tag wieder starke Benommenheit, starker Acetongeruch, im Urin 2,8 % Zucker. Im 3. Monat nach Aufnahme besteht immer noch starke Benommenheit bei starkem Acetongeruch. Patient bekommt wieder 60 E. Der Urinzucker beträgt 2,4 %. Gegen Abend zunehmende Herzschwäche und schliesslich Exitus.

Epikritisch ist dieser Fall wegen der ungenügenden klinischen Angaben über das Verhalten des Blutzuckers und des Urinzuckers schwer zu deuten. Am nächstliegenden würde es erscheinen, das Zustandsbild des Patienten als epileptisches Irresein zu deuten, bei welchem sich gelegentliche Zwischenfälle von seiten des Diabetes in Form von Coma diabetikum einstellten. Die Hirnuntersuchung spricht aber u. E. weniger für eine Epilepsie als vielmehr für eine organisch zirkulatorische Störung, die man angesichts des Alters des Patienten nicht als arteriosklerotisch bedingt auffassen kann. Es erscheint uns vielmehr wahrscheinlich, dass die vor der Aufnahme des Patienten 2 Tage bestehenden Krämpfe ausgelöst waren durch einen hypoglykämischen Schock, denn seinerzeit hat er ja Insulin bekommen. Dieser Schock hatte zwar nicht zum Exitus geführt, sondern nur schwere Veränderungen am Nervensystem gesetzt, welche von diesem 3 Monate dauernden Verwirrungszustand gefolgt waren. Wir können uns die nun zu beschreibenden Hirnveränderungen kaum anders deuten.

Sektionsbefund: Gewicht des Gehirns 1160 gr., Basis o. B.. Herz und Lunge zeigen nichts besonderes, ebensowenig die anderen Organe. Das Pankreas ist klein und hat ein Gewicht von 65 gr.

Makroskopisch ist das Gehirn unverändert, auch auf Frontalschnitten lässt sich nichts besonderes nachweisen. Die uns in liebenswürdiger Weise überlassenen Schnitte stammen aus den verschiedensten Teilen des Gehirnes.

Mikroskopischer Befund: als wichtigsten Befund schildern wir

herdförmige Veränderungen in der Grosshirnrinde und zwar von allen Dingen im Bereich des Temporal- und des Frontalhirns. Die herdförmigen Veränderungen im Temporal-Pol liegen nicht nur im Bereich des Ammonshornwulstes, wo wir ja gerade bei der Epilepsie häufig zirkulatorisch bedingte Schichtausfälle beobachten, sondern vor allem im Bereich der ersten und der zweiten Temporal-Windungen. Im breiten Band des Sommerschen Sektors zeigt sich ein charakteristischer Ausfall. Die Veränderungen sind sonst am stärksten ausgeprägt in dem Windungsteil zwischen 1. und 2. Temporalwindung, deren Rinde bis auf wenige Zellen vollkommen zerstört ist. Wir finden dort eine ausgedehnte gliöse Reaktion vorwiegend zusammengesetzt aus gemästeten Gliazellen und Gitterzellen. Ausserdem zeigt sich auch eine gewisse Kapillarsprossung, wie wir sie eben von der Kolliquationsnekrose her zu sehen gewohnt sind. Auffallend stark von gemästeten Gliazellen durchsetzt ist die Molekularzone dieses Abschnittes, so dass man den Eindruck gewinnen konnte, der Prozess hätte sich besonders stark von den Meningen her entwickelt. Allerdings reicht die Schädigung gerade in der Umgebung der 2. Temporalwindung bis ins Mark hinein und hat dort auch gleichfalls zu einer intensiven Gliose Anlass gegeben. Es handelt sich zweifellos um einen vasa bedingten Herd im Endstadium der Erweichung mit schon einsetzender Narbenbildung. Auf Fettpräparaten sieht man massenhaft Fettkörnchenzellen, doch sind auch die gemästeten Gliazellen mit scharlachrotpositiven Körnchen beladen. Im subkortikalen Mark liegen Fettröpfchen z. T. auch frei herdförmig zusammen. Die Silberfärbungen an diesen Stellen (Biellowschowsky) zeigen neben einer entsprechenden stärkeren Anfärbbarkeit frischgewucherter Kapillaren sogenannte „Cordon unitifs“ als Anzeichen für junge, frisch gebildete Bindegewebsfasern.

Herde von ähnlicher Beschaffenheit zeigen sich auch in der 1. und 2. Temporalwindung der anderen Seite und zwar sieht man dort über längere Strecken hin die erste, zweite und dritte A- und B-Schicht schwerst verändert; stellenweise fehlt auch die ganze 3. Schicht und schliesslich ist an manchen Stellen das ganze Rindenband von einem bis ins Mark reichenden Herd durchsetzt. Im Mark derselben Windungen sieht man massenhaft Leukozyten Thromben innerhalb der Venen, die stellenweise stark erweitert sind. Auch hier hat man den Eindruck, dass es sich um vorwiegend zirkulatorisch bedingte Schädigungen handelt, bei welchen besonders die meningennahen Schichten gelitten haben. Innerhalb der Meningen selbst ist ausser vereinzelt Makrophagen nichts nachweisbar. Wie oben schon erwähnt, ist auch auf der einen Seite die Ammonshornformation mitbetroffen. Im breiten Band der

sogenannten Sommerschen Sektors findet sich ebenfalls ein subakuter Erweichungsherd mit allen Kriterien des Abbaus.

Einen ganz ähnlichen Herd weist auch eine Stirnwindung auf. Auch dort sind besonders die oberen Schichten betroffen. Der Prozess selbst dehnt sich über eine Windungskuppe und deren Tal aus.

Das Klastrum der einen Seite zeigt an seiner Basis gleichfalls einen kleinen, ungefähr stecknadelkopfgrossen Herd, der besonders deutlich im Fettbild zu erkennen ist. Neben typischen Fettkörnchenzellen sieht man gemästete Gliaelemente mit Fett beladen und Stäbchenzellen. Die letzteren zeigen polständig im Kern jeweils feinste Fett-Tröpfchen.

Auch die Inselrinde hat stellenweise stark gelitten. So lassen sich in einem Windungsteil wieder schwere Zellausfälle in den oberen 3 Schichten mit entsprechender Gliaersatzwucherung feststellen. Einzelne Ganglienzellenreste sind noch erhalten in Form dreieckiger pyknotischer Kernreste. Auch hier ist eine deutliche Gefässvermehrung nachweisbar.

Andere Hirnpartien, sowohl Rinde und Stamm, zeigen wenig charakteristisches. Die Rinde ist zwar im allgemeinen diffus gelichtet, besonders in der 3. Schicht, doch lässt sich mit diesem uncharakteristischen Befund nicht viel anfangen. Der Hirnstamm selbst, insonderheit Mittelhirn, Medulla Oblongata und auch die Zwischenhirnabschnitte zeigen nichts sicher Krankhaftes.

Epikrise des histologisch-pathologischen Befundes:

Die geschilderten herdförmigen Veränderungen, besonders der Rinde, stellen zweifellos Erweichungsherde dar, die im Begriffe sind zu vernarben. Wenn wir uns nun nach der Pathogenese dieser Schäden fragen, so fällt uns angesichts der etwas mangelhaften Krankengeschichte die Deutung nicht leicht. Jedenfalls kommen wir nur per exclusionem der eigentlichen Ursache am nächsten. Ein diabetisches Coma pflegt derartige Gehirnveränderungen nicht hervorzurufen. Dies ist hinlänglich bekannt. Die Hirnbefunde bei einem an diabetischem Coma Verstorbenen, sind im Gegensatz zu denjenigen beim uraemischen Coma, insbesondere bei der akuten und chronischen Pseudouraemie, absolut uncharakteristisch. Gefässbedingte Herde wurden jedenfalls bisher beim Coma diabeticum nicht beschrieben. Solche können höchstens dann beobachtet werden, wenn es sich um eine Kombination eines Diabetes mit einer Arteriolosclerose der Hirngefässe handelt, die im vorgerückten Alter ja nicht selten vorkommt. Analog zur sogenannten Retinitis diabetica, die nach der massgeblichen Meinung der Ophthalmologen mit dem Diabetes als solchem direkt nichts

zu tun hat, sondern auf das Konto mit vorkommender Gefässerkrankungen zu setzen ist, können bei einem Diabetes verbunden mit Arteriolosclerose der Hirngefäße auch herdförmige, gefäßbedingte Veränderungen im Gehirn erwartet werden. Kommen solche vor, so sind sie wegen der schon angegebenen Gründe aber nicht auf den Diabetes direkt, insonderheit nicht auf das diabetische Coma zu beziehen. Derartige Gefässerkrankungen im Sinne einer Arteriolosclerose der Hirngefäße liegen aber in unserem Falle nicht vor, fallen also auch nicht weiter ins Gewicht. Ebenso wenig haben wir Anhaltspunkte für eine pseudouraemisch-eklamptische Hirnschädigung, sowohl nicht im Sinne einer akuten noch einer chronischen Pseudooraemie, für welche ja Bodechtel charakteristische Hirnbefunde beschrieben hat, die unseren eben beschriebenen vasalen Schädigungen sehr ähnlich sehen können, wie auch nicht im Sinne einer akuten Uraemie, die ja nach Bodechtel zu gliösen Herden nur im Grosshirnmark führt. Auch für eine Endocarditis, die häufig zu herdförmigen Rindenveränderungen Anlass gibt, fehlen Hinweise, sowohl aus der Krankengeschichte wie insbesondere aus dem Sektionsprotokoll.

Etwas schwieriger ist die differentialdiagnostische Abgrenzung der geschilderten Gehirnveränderungen gegen jene bei der Epilepsie, die wir nach den Arbeiten Spielmeysers und seiner Schule bei Epileptikern in einem relativ hohen Prozentsatz der Fälle beobachten können. Hierbei handelt es sich aber in erster Linie um Ausfälle im Bereich des Sommerschen Sektors des Ammonshornwulstes und um Veränderungen im Kleinhirn nach der Art von Kleinhirn-Strauchwerken oder Läppchensklerosen. Scholz hat allerdings auch in anderen Rindenbezirken (Z. neur. 145, S. 471) vasalbedingte herdförmige Veränderungen gesehen. Doch handelte es sich dann jeweils immer um jahrelangdauernde Epilepsien mit wiederholtem Status, was bei unserem Patienten auch nicht in Frage kommt. In unserem Falle liegen die herdförmigen Veränderungen nur in der Grosshirnrinde; das Kleinhirn zeigt nichts charakteristisches.

Allerdings könnte man auch daran denken, ob nicht die Rinde traumatisch geschädigt sein könnte durch einen Sturz auf den Kopf während eines der beobachteten Anfälle. Auf derartige traumatische Rindenschädigungen hat vor allen Dingen Spatz hingewiesen. Sie werden am häufigsten beobachtet im Bereich des Orbitalgehirns und des Temporal-Pols, sind meistens symmetrisch ausgebildet und entstehen durch den Aufprall des Gehirns auf den darunter liegenden Knochen infolge des an solchen Stellen mangelnden Liquorkissens. Sie führen zum Bild der sogenannten Plagues jaunes oder zum sogenannten Etat vermoulu und sind

meistens schon makroskopisch zu erkennen. Auch etwas Derartiges liegt nicht vor.

Aus unserem histologisch-pathologischen Befund glauben wir schliessen zu dürfen, dass die geschilderten Rindenveränderungen als Folge eines schweren hypoglykämischen Schocks aufzufassen sind; denn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit handelte es sich bei unserem Patienten bei den zur Klinikaufnahme führenden, 2 Tage lang dauernden Krämpfen um einen solchen. Jedenfalls liegen zirkulatorische Störungen vor, für welche wir ausser der Annahme eines hypoglykämischen Schocks nach der eben gegebenen Epikrise keine andere Ursache finden konnten.

Dem histologischen Bild nach handelt es sich zweifellos um eine schon länger zurückliegende Schädigung, denn wir sehen ja schon das Bild der voll ausgeprägten Erweichung mit Uebergang in das Narbenstadium. Auch diese Moment kann für unsere Erklärung zur Unterstützung mit herangezogen werden. Jedenfalls wäre es denkbar, dass die 3 Monate ante exitum aufgetretenen Krämpfe von an verschiedenen Stellen des Gehirns aufgetretenen Zirkulationsstörungen begleitet waren, als deren Folgezustand die geschilderten herdförmigen Rindenschäden blieben. Was die nach den eigentlichen schweren Krämpfen auftretende Psychose des Patienten anlangt, so denken wir sie uns ausgelöst durch den beim hypoglykämischen Schock hervorgerufenen schweren Parenchym Schaden und weiterhin unterhalten durch die pathologische Stoffwechsellage mit ihren komatösen und präkomatösen Zuständen, für die wir aus der Krankengeschichte genügend Hinweise haben. In unserem Falle war es also zu einer schweren Rindenschädigung des Gehirns im Anschluss an einen hypoglykämischen Zustand gekommen, zu einer Schädigung, die wohl deshalb nicht reparabel war, weil der Zustand als solcher nicht erkannt worden war, die Krämpfe über 2 Tage gedauert hatten, der Exitus aber wohl deshalb nicht eintrat, weil das Blutzuckerniveau sich von selbst wieder hob. Der hypoglykämische Schock als solcher war spontan wieder zurückgegangen, aber die von ihm einmal gesetzten schweren Schädigungen des Gehirns waren geblieben und führten nun zu einem schweren psychotischen Zustandsbild, das in seiner Art jenen Psychosen gleicht, wie wir sie bei anderen cerebralen Zirkulationsstörungen beobachten. Es ist nicht unsere Aufgabe, auf diese Fragestellung näher einzugehen. Man könnte auch an eine nach dem Schock aufgetretene Diabetes-Psychose denken, die ja gelegentlich gerade bei Patienten, die zu Hypoglykämie neigen, auftritt. So hat Scherer einen solchen Fall beschrieben (Z. Neur. 134, S. 60).

Dem histologischen Bild nach ähnelt dieser Fall am meisten demjenigen von Schleussing und Schuhmacher. Auch dort stehen im Vordergrund die mehr oder weniger vollständigen Erweichungen, mit Fettkörnchenzellen gemästete Gliazellen und Veränderungen im Gefässbindegewebsapparat. Auffallenderweise haben Schleussing und Schuhmacher gerade auch im Gyrus hippocampi die schwersten Veränderungen getroffen. Unsere Auffassung des von Schleussing mitgeteilten Falles als Folge eines hypoglykämischen Schocks und nicht als Folge des vorliegenden schweren Diabetes mellitus bedarf noch einer Rechtfertigung. Auch hier können wir allein aus dem histologischen Befund am Gehirn eine mögliche pathogenetische Rolle des Diabetes ausschliessen, denn wie oben schon auseinandergesetzt pflegt das von Gefässveränderungen freie Diabetikergehirn auch im schwersten Coma keine herdförmigen vasalen Schädigungen aufzuweisen. So konnte Bodechtel an dem grossen Material der Forschungsanstalt für Psychiatrie in München bei Fällen, die noch vor der Insulinära an einem typischen Coma diabeticum ad exitum gekommen waren, niemals derartige Veränderungen, die sich ohne weiteres als vasal bedingt hätten erkennen lassen, feststellen.

Bei Schleussing und Schuhmacher handelte es sich um ein 11 Jahre altes Kind, das zuerst im Coma eingeliefert war und dann wieder hypoglykämisch wurde. Dabei wurden auch Krämpfe beobachtet. Der erste hypoglykämische Anfall war länger als 2 Monate vor dem Exitus schon aufgetreten. Dieser erste sehr schwere Anfall dauerte mindestens 12 Stunden, da in der ihm vorhergehenden Nacht schon Krämpfe und tiefe Benommenheit festgestellt wurden. Bei der Einlieferung hatte der Blutzucker sogar wieder eine Höhe von 676 mgr. %. Am darauffolgenden Morgen betrug der Blutzuckerwert nurmehr 73 mgr. %, während der 2 Tage zuvor letztmalig bestimmte noch einen Stand von 566 mgr. % aufwies. Das Kind war also unmittelbar aus einem tiefen diabet. Coma heraus in einen schweren hypoglykämischen Zustand verfallen. Noch am gleichen Tage um 18 Uhr abends stetzte der nächste hypoglykämische Zustand ein. In der Zeit von Mittag 12½ h bis 18 h abends, wo die nächste Blutzuckerbestimmung vorgenommen wurde, war der Blutzucker von 205 mgr. % auf 76 mgr. % gestürzt. Das klinische Zustandsbild dieses neuerlichen hypoglykämischen Schocks hielt nun vom 21. 3. bis 26. 3. 33 ohne wesentliche Veränderungen an; während dieser Tage herrschte stets tiefe Bewusstlosigkeit, häufig begleitet von tonisch-klonischen Krämpfen. Auch zeigte die Blutzuckerkurve in diesem Zeitraum noch einige Schwankungen, nämlich in Gestalt eines Anstiegs des Blutzuckerwertes auf zuerst 86 mgr. %

End später 108 mgr. ‰, dem ein nochmaliger Abfall auf 65 mgr. ‰ folgte. Am 26. 3. betrug der Blutzuckerwert 100 mgr. ‰ und an diesem Tag trat auch erstmals eine objektive Besserung ein. Von diesem 2. schweren langdauernden hypoglykämischen Zustand an zeigte die Patientin das von Schleussing und Schuhmacher beschriebene Verhalten, das dem eines „grosshirnlosen Individuums“ glich und welches sich nurmehr in automatischen und impulsiven Bewegungen äusserte. Dieser Zustand hielt noch fast 2 Monate an, bis endlich insgesamt 72 Tage nach Einlieferung in das Krankenhaus der Exitus eintrat. Die Blutzuckerkurve zeigte während der letzten 2 Monate nurmehr unwesentliche Schwankungen.

Ein ähnliches Zustandsbild, das nur viel früher zum Tode führte, war auch im Falle Bodechtels vorhanden. Auch hier muss man sich vorstellen, dass der erste am schwersten sich auswirkende hypoglykämische Schock zu lange gedauert hatte und trotz energischer Traubenzuckerbehandlung war die einmal gesetzte Schädigung am Nervensystem nicht mehr zu beheben. Die von Bodechtel geschilderten Befunde unterscheiden sich von denjenigen von Schleussing und Schuhmacher nur dadurch, dass bei ihnen noch keine vollständige Erweichung in den geschilderten Bezirken nachweisbar war, sondern das Vorstadium der Erweichung die sogenannte Erbleichung (nach Spielmeier) d. h. das erste Stadium der ischaemischen Nekrose. Hätte der Fall von Bodechtel längere Zeit gelebt, dann wären ebenso wie in dem Fall von Schleussing und Schuhmacher Fettkörnchenzellen (Gitterzellen) und entsprechende Veränderungen am Gefässbindegewebsapparat im Sinne von Gefäss-Sprossungen nachzuweisen gewesen.

Aus einem ähnlichen Grunde muss uns die Erklärung von Thannhauser, Ostertag und Dünnert über die Pathogenese beim Insulin-Schock bezüglich einer primären Gefäss-Schädigung nicht stichhaltig erscheinen. Bei jeder Art von zirkulatorischer Schädigung des Gehirns, sei es, dass eine solche hervorgerufen ist durch eine Fett- oder Luftembolie oder durch einen Angiospasmus, für dessen tatsächliches Vorkommen die jüngst erschienenen Mitteilungen von Bodechtel und Wichmann über Schädigungen des Grosshirns nach Arteriographie den direkten Beweis erbracht haben, finden wir in dem zirkulatorisch geschädigten Gebiet nicht nur den Untergang der Ganglienzellen und entsprechende Schädigung der Gliaelemente, sondern auch Folgeerscheinungen am Gefässapparat selbst. Diese sind aber nicht als Ursache der Unterbrechung der Zirkulation anzusprechen, sondern treten immer dann auf, wenn entsprechend lange Zeit — vom Eintreten des Schadens an bis zum Exitus gerech-

net — verstrichen ist. Es handelt sich dabei um Veränderungen an den Gefässen, die uns vor allem als eine Endarteriitis der kleinen Hirngefässe erscheinen. Nun haben die letzten Jahre aber eindeutig gezeigt, dass sowohl die Endarteriitis der kleinen Hirngefässe wie sie *Alzheimer* als besondere Befunde bei einigen Fällen von Hirnlues beschrieben hat, wie auch die Endarteriitis der kleinen Hirngefässe, über welche *Bonfiglio* (zitiert nach *Spielmeier*, Histopathologie des Nervensystems, Springer 1922) bei seinen Bleihunden berichtete, lediglich als ein bestimmtes Stadium der Reaktion des Gefässapparates auf einen zirkulatorischen Schaden (Ischaemie) anzusprechen sind. Hat man doch derartige Gefässproliferationen bei allen möglichen anderen organischen und funktionellen Zirkulationsstörungen des Gehirns beobachten können. Man vergleiche die Befunde, die *Winkelmann* (Z. neur. 102), *G. Müller* (Z. neur. 124) und auch *Bodechtel* (Z. neur. 140) beschrieben haben. Die von *Ostertag*, *Thannhauser* und *Dünner* geschilderten Veränderungen an den Hirngefässen der mit Insulin vergifteten Tiere sind also nicht etwa als eine besondere Reaktion des Gefässapparates auf das Insulin aufzufassen, sondern sind eine Begleiterscheinung des Gefässbindegewebsapparates innerhalb der zirkulatorisch geschädigten Hirnpartien. Dass diese Autoren sie besonders oft sahen, hängt damit zusammen, dass bei ihren Versuchstieren in erster Linie die Vergiftungen d. h. die hypoglykämischen Zustände wiederholt und über längere Zeit hin durchgeführt wurden, sodass dem Gefässbindegewebsapparat der geschädigten Hirnpartien genügend Zeit blieb, in der von den Autoren geschilderten Art einer Endothelproliferation zu reagieren. Es geht unseres Erachtens nicht an eine solche Teilerscheinung eines histopathologischen Geschehens als den besonderen Ausdruck einer gewissermaassen spezifischen Wirkung auf einen bestimmten Gewebsfaktor, in diesem Fall den Gefässapparat, zu betrachten.

Ähnlich liegen die Verhältnisse bei den von *Wohlwill* beschriebenen Fällen. Dieser Autor hat als erster über Hirnveränderungen beim hypoglykämischen Zustand berichtet. Nach seiner Meinung handelt es sich dabei um toxische Schäden und zwar wegen des Vorherrschens der sogenannten „schweren Zellveränderungen“. Diese Tatsache dürfte jedoch keinen Gegenbeweis gegen die Annahme eines gefässbedingten Prozesses liefern, zumal *Bodechtel* und *Müller* auf Grund ihrer Tierversuche den Beweis erbrachten, dass bei experimenteller Embolie neben der „homogenisierenden-ischämischen“ Zellerkrankung auch typische „schwere“ Zellveränderungen vorkommen. Was die sonstigen Veränderungen, von denen *Wohlwill* berichtet, betrifft, näm-

ich die Gliaamoeboidose und die Achsenzylinder-Auftreibungen, so stellen dieselben einen für die pathogenetischen Betrachtungen uncharakteristischen Befund dar, da sie ja auch bei echt entzündlichen Vorgängen auftreten oder auch bei solchen rein vasaler Natur, wie zum Beispiel bei einer Erweichung.

Am nächstliegenden erscheint uns auch noch angesichts des vorhin mitgeteilten Falles doch die Ansicht Bodechtels über das Zustandekommen der beim hypoglykämischen Schock auftretenden Hirnveränderungen. Dieser Autor nimmt, gestützt auf die klinischen Erscheinungen beim hypoglykämischen Schock (Tachy- und Bradycardie, Absinken des Blutdruckes usw.) und auf die pathologisch-anatomischen Befunde von Jakoby und Ehrmann an, dass der hypoglykämische Zustand von schweren zirkulatorischen Störungen funktioneller Art begleitet ist, die sich an dem an und für sich gegen Zirkulationsstörungen besonders empfindlichen Gehirn sehr schwer schädigend auswirken können. Gelingt es nicht rechtzeitig, die Hypoglykämie und die sie begleitenden funktionellen Kreislaufstörungen durch Traubenzuckerinjektionen zu beheben, dann wird der nun gesetzte Schaden am Zentralnervensystem irreparabel und führt zu schweren, auch langdauernden organischen Zustandsbildern. (Man vergleiche die Fälle Schuhmachers und Schleussings mit dem eben geschilderten, die schliesslich zum Exitus führten.) Sowohl der Fall Schleussing-Schuhmacher wie auch die tierexperimentellen Untersuchungen von Ostertag, Dünner und Thannhauser stellen jedenfalls einen neuerlichen Beweis dar für die von Bodechtel gegebene Erklärung. Das sowohl von Wohlwill, wie auch von diesen Autoren besonders gewürdigte Hirnoedem mit den dabei histologisch zu findenden Veränderungen in der Markglia (Amoeboidose und Clasmadodentrose) stellen nach Bodechtel ebenfalls keinen besonders charakteristischen Befund dar. Finden wir doch auch bei anderen Zirkulationsschädigungen häufig ein Hirnoedem. Man erinnere sich nur an die akute Pseudoouraemie (eklamptische Uraemie), bei welcher neben typischen histologisch nachweisbaren ischaemischen Herden in der Hirnrinde (Spielmeyer, Bodechtel, Hechst) das schon makroskopisch zu sehende Hirnoedem fast immer zu beobachten ist. Allerdings stehen sich hier bekanntlich zwei Meinungen gegenüber. Während nämlich Volhard im Anschluss an Traube das Hirnoedem für das Primäre, die ischaemischen Rindenveränderungen für das Sekundäre hält, nehmen Lichtwitz und Fahr das Umgekehrte an und erklären das Hirnoedem als zirkulatorisch entstanden. Wir glauben deshalb nicht fehlzugehen, wenn wir für das Hirnoedem des hypo-

glykämischen Schocks das gleiche annehmen und es uns gleichfalls entstanden denken durch die schwere Zirkulationsstörung innerhalb des Gefäßgebietes des Gehirns.

Zum Schlusse möchte ich Herrn Oberarzt Privatdozenten Dr. B o d e c h t e l für die Anregung zu dieser Arbeit, sowie für seine wertvollen Hinweise und Unterstützungen bei der Bearbeitung dieses schwierigen Fragenkomplexes meinen herzlichsten Dank aussprechen.

Lebenslauf.

Am 5. Juni 1909 wurde ich als dritter Sohn des Pfarrers Karl Wolff und seiner Ehefrau Agnes geb. Schaudig zu Schopflohe am Ries geboren. Nachdem ich viereinhalb Jahre dortselbst die Volksschule besucht hatte, kam ich im Frühjahr 1919 auf das Progymnasium Oettingen im Ries. Dieses absolvierte ich im Jahre 1925. Die letzten 3 Jahre der Mittelschule verbrachte ich am Gymnasium Ansbach, wo ich auch im März 1928 die Reifeprüfung ablegte.

Trotz des frühen Todes meiner beiden Eltern wurde es mir ermöglicht, das Hochschulstudium zu ergreifen. Im Sommersemester 1928 bezog ich als Student der Medizin die Universität Erlangen. Nach vollständig abgelegter ärztlicher Vorprüfung während des Wintersemesters 1930/31 besuchte ich für ein Semester die Universität Graz und für weitere zwei Semester die Universität München. Den Rest meiner Studienzeit verbrachte ich wiederum in Erlangen, wo ich mich im Wintersemester 1933/34 der ärztlichen Staatsprüfung unterzog. Darnach war ich als Medizinalpraktikant im ganzen 6 Monate an der Lungenbeobachtungsstelle der Landesversicherungsanstalt für Mittel- und Oberfranken und die übrigen sechs Monate an der medizinischen Klinik in Erlangen tätig, woselbst ich mich vorwiegend auf der von Oberarzt und Privatdozent Dr. Bodechtel geleiteten Nervenabteilung betätigte. Am 11. Februar 1935 erhielt ich vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus die Approbation als Arzt.
